

Descrizione del prodotto:



Welldone SAP® è [Polyacrylate di potassio](#) Polimero, se incorporato nel suolo o nel substrato, assorbe e conserva grandi quantità di acqua e sostanze nutritive.

Aiuto con la crescita delle piante precoci, la struttura del sistema di root e il mantenimento dell'umidità del suolo.

Come mais, grano, mais, arachidi, pepe, bastone da zucchero di soia, grano, avena ecc.


Welldone Aquasorb è un fermo idrico che, se incorporato in un terreno o un substrato, assorbe e conserva grandi quantità di acqua e sostanze nutritive. Welldone Aquasorb ha la proprietà di rilasciare facilmente acqua e nutrienti assorbiti, consentendo in tal modo all'impianto di avere acqua e sostanze nutritive disponibili a volontà come funzione del ciclo di rilascio di assorbimento.

Caratteristiche e benefici :

- Sicurezza e biodegradazione ● Frequenza di irrigazione ridotta del 50%.
- Migliora la crescita delle piante ● Migliorare la struttura del suolo

- Limiti perdita di nutrienti ● lunga durata. Efficacia nel terreno fino a 5 anni.

Come funziona :



Absorbing Water


- The polymer consists of a set of polymeric chains that are parallel to each other and regularly to each other by cross-linking agents, thus forming a network.
- When water comes into contact with one of these chains, it is drawn into the molecule by osmosis.
- Water rapidly migrates into the interior of the polymer network where it is stored.

Releasing Water


- As the soil dries out, the polymer releases up to 95% of the absorbed water into the soil.

Risultati del test:

- Nell'agricoltura della canna da zucchero a pioggia, il polimero super assorbente migliora i tassi di trapianto e di crescita dei germogli di canna durante la stagione secca e ha permesso un aumento significativo dei rendimenti.
- La resa dello zucchero di grafici trattati con 15 kg / ha aumentato del 25% rispetto alle trame di controllo.
- Il gel polimerico SAP WELDDONE è stato applicato localmente nel solco del raccolto quando i germogli sono stati ripiantati.



Metodo e dosaggio:



Metodo :

Mescolare la linfa con il suolo fine, lancia anche nella piantagione del solco o nella piantatura della grotta, dopo la semina, l'annaffiatura, poi riempita di terreno al punto di fossato.

Dosaggio:

- SAP per mais, fagioli di soia, arachidi: 22.5-30 kg / ha

PRODOTTO SAP WELDDONE CONSIGLIATO:

WD-KS02, WD-K03, WD-KS05, WD-KS06

Confezione e consegna:



About Packing



WELLDONE · SHANDONG · CHINA

